

Tátika Erdőrezervátum

ER-39 (HU)

Tátika Erdőrezervátum (Bakony)

core area: 87.5 ha; buffer zone: 171.7 ha; total area: 259.2 ha

Dunántúli-középhegység

Bakonyerdő Zrt.

Balaton-felvidék National Park Directorate

Long term surveillance (HTV)

Storyline

A jellemző állomány nagy kiterjedésű, plató helyzetű, változatos lombkoronaszintű, elegyes (azonban másodlagos - vagyis ültetett eredetű) bükkös, amely nagyrészt összeroppanási fázisban van. Gyors változások várhatók, a természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatára alkalmas.

1999

"The characteristic stand is large, located on a plateau, has a varied canopy layer, mixed (however secondary – i.e. planted) beech forest, which is mostly in the breakdown and dieback phase. Quick changes may be expected, the reserve is suitable for studying the natural forest dynamics."

Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]

Classification 1999: Long term surveillance (HTV)

Fő eredmények

Kutasi Csaba, Ságghy Zsolt (2002): A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 19-2000:69-78.

Selected publications

Összes publikáció

-
- 2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert
Weissenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo
(2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European
beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of
climate change. RIO 9: e109816
-
- 2018 Vandekerckhove, Kris, Margot Vanhellemont, Tomáš Vrška, Peter Meyer,
Vath Tabaku, Arno Thomaes, Anja Leyman, Luc De Keersmaecker, Kris
Verheyen (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (*Fagus
sylvatica* L.) forest:
Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites
in Europe. *Forest Ecology and Management* 417: 1-17.
-
- 2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A *Ganoderma cupreolaccatum* (syn. *G.
pfeifferi*) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The
Hungarian distribution and taxonomic status of *Ganoderma
cupreolaccatum* (syn. *G. pfeifferi*). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és
ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. *Mikológiai
Közlemények - Clusiana* 51(1): 76-78.
-
- 2010 Král, Kamil, Tomáš Vrška, Libor Hort, Dusan Adam and Pavel Samonil
(2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech
forest: determination by supervised classification method. *Eur J Forest Res*
129: 339-351.
-
- 2007 Bartha D. és Gálhidy L. [szerk.] (2007): A magyarországi erdők
természetessége. WWF füzetek 27., WWF Magyarország, Budapest
-
- 2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok
kutatásszempontrú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és
Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és
módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.