

Vojtkó A. (1992): A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 139-150.

Reference: Vojtkó A. (1992): A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 139-150.

Short reference: Vojtkó (1992)

First author: Vojtkó András

Year: 1992

Abstract

A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata

A dolomit alapkőzet alárendelt szerepű a Bükk hegységben a triász mészkőtömbhöz képest, így jelentősége különleges sajátosságaiból adódik. A kőzet geomorfológiai tulajdonságai révén olyan mikroklímát alakít ki, amely nehezen engedi beerdősülni a dolomit lejtőket. A déli-délnyugati oldalakon ennek következtében páratlan fajgazdagságú, szubmediterrán jellegű nyílt és zártabb gyepek uralkodnak, váltakozva bokorerdő és tölgyes foltokkal.

Az Északi-középhegységben még nem történtek vizsgálatok a dolomitnövényzetre vonatkozólag, csupán utalásokat találhatunk (Suba et al. 1982, Bakalárné et al. 1982-83) a *Cypripedium calceolus* termőhelyjellemezése kapcsán. Ezt a hiányt felismerve kezdtünk vizsgálatokat a Déli-Bükkben: a Várhegy-Csákpilis és Miklós-hegy-Keréktörő-hegy dolomitnövényzetén. Részleges eredményként két, a Bükk hegységből eddig még nem említett növénytársulásra hívjuk fel a figyelmet: *Cotino-Quercetum pubescentis*, *Seslerietosum hungaricae* (bükkense), *Seslerio-Quercetum pubescenti-petraeae*.

[biodiversity: higher plants](#)

[phytosociology](#)

Notes

Címszavazva - VA

Journal: Fol. Hist.-nat. Mus. Matr.

Location: ER Archívum (1992/P-001)

Type: scientific paper

Strict forest reserves: [Vár-hegy Forest Reserve](#) Katalógusba vette: Gulyás Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: Tue, 07/01/2008 - 12:00