

**Kenderes K. és Standovár T. (2007):
Természetes lékek felújulásának vizsgálata a
bükki Őserdő Erdőrezervátumban.
Természetvédelmi Közlemények 13: 101-108.**

Reference: Kenderes K. és Standovár T. (2007): Természetes lékek felújulásának vizsgálata a bükki Őserdő Erdőrezervátumban. Természetvédelmi Közlemények 13: 101-108.

Short reference: Kenderes és Standovár

First author: Kenderes Kata

Year: 2007

Abstract

Természetes lékek felújulásának vizsgálata a bükki Őserdő Erdőrezervátumban
Kenderes Kata és Standovár Tibor

Összefoglalás: A bükki Őserdő Erdőrezervátum területén a természetes lékképződés dinamikáját vizsgáltuk archív légifelvétel sorozat térinformatikai elemzésével. Ennek eredményeit felhasználva kor és méret alapján kiválasztott 27 lékben terepi mintavétellel megvizsgáltuk az erdő megújulását biztosító újulatot is. A kiválasztott lékekben 25 m²-en az újulat minden egyede esetében feljegyeztük a fafajt, a rágottságot, illetve a magassági osztályt. Eredményeink szerint a lékekben átlagosan 45541 db/ha csemete van, tehát az újulat mennyisége bőven elegendő az erdő folyamatos fennmaradásához. Az állományban pillanatnyilag táplálkozó vadállomány azonban az újulat felnövekedését meggátolja, fajösszetételét pedig jelentősen megváltoztatja. Megállapítható, hogy a természetes erdődinamika érvényesüléséhez szükséges a környező állományokban a vadfajok élőhelyének fejlesztése, illetve a vadlétszám apasztása.

[forest ecology: game affect, browsing](#)

[forest structure: regrowth](#)

Notes

lék, újulat, vadhatás, természetközeli bükkös, erdőrezervátum, fafaj

Címszavazva - GE

Publisher: Magyar Biológiai Társaság, Budapest

Journal: Természetvédelmi Közlemények

Location: ER Archívum (2007/P-033/1, 2007/P-033/2)

Type: scientific paper

Strict forest reserves: [Őserdő Forest Reserve](#) Katalógusba vette: Gulyás
Györgyi

Katalógusbavétel időpontja: Mon, 04/11/2011 - 12:00