

Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) termőhelyi vizsgálata. Kutatási jelentés, Sopron, 33 old.

Teljes hivatkozás: Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) termőhelyi vizsgálata. Kutatási jelentés, Sopron, 33 old.

Rövid hivatkozás: Bidló és Kovács (1998)
Első szerző: Bidló András
Év: 2018

Összefoglalás:

Az erdőrezervátum területe geomorfológiailag viszonylag egységes, sík terület. A K-i felében egy több méterrel magasabb homokbucka vonulat jelentkezik, amely alapvetően megváltoztatja a termőhelyi viszonyokat. Így a területet alapvetően két egymástól tulajdonságaiban lényegesen eltérő részre tudjuk szétválasztani. Az egyik a mélyebb fekvésű részekben, ahol a talajvíz a felszínhez közel helyezkedett el, réti erdőtalajok jöttek létre. ... A terület K-i felében jóval szárazabbak a viszonyok, nem áll rendelkezésre a talajvízből származó víztöbblet a fák növekedéséhez. ... a terület egészét érintő talajvízszint süllyedés következett be a területen.

élőhely: láp- és ligeterdők

talaj - termőhely

térkép: talaj-, termőhelytérkép

Megjegyzések:

Készült a KöM Természetvédelmi Hivatal Tájvédelmi, Erdészeti és Területfenntartási Főosztály megbízása alapján.

Térképmelléletek:

- talajszelvények és talajfúrások helye és sorszáma
- ganatikai talajtípus térkép
- humusz mennyisége térkép
- humuszos szint vastagsága térkép
- termőréteg vastagság térkép
- fizikai féleség térkép
- talajvíz mélység térkép

Lelőhely: ER Archívum - digitális

Típus: kutatási jelentés, jegyzőkönyv, digitális adat

Erdőrezervátumok: [Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE](#) Katalógusba vet

Horváth Ferenc

Katalógusbavétel időpontja: 2022-08-26